

令和5年度 柿・平核無病害虫防除基準

ながのブロック

回数 散布時期 散布日 重点防除期間	IRAC FRAC コード	薬剤名	薬剤量	倍率	散布量 (10a当り)	対象病害虫 *太字は重点 病害虫	収穫前 使用 規制	年間 使用 回数	主な作業と注意事項及びドリフト対策
1 発芽前 3月下旬 ~ 4月上旬 月 日	M2	水 展着剤(マイリノー) 石灰硫黄合剤	90 ℓ 5 mℓ 10 ℓ	20,000 倍 10 倍	350 ℓ	越冬病害虫 カイガラムシ類 ハダニ類	発芽前	—	○カイガラムシ類の冬期の粗皮削りは有効である。 ○カイガラムシ類が多い場合はスプレーオイル50倍(2ℓ)液を発芽前に散布する。
2 5月中旬 月 日	M3 4	水 展着剤(マイリノー) トレノックスフロアブル ⑩ モスピラン顆粒水溶剤	100 ℓ 5 mℓ 200 mℓ 50 g	20,000 倍 500 倍 2,000 倍	400 ℓ	うどんこ病 黒星病 カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ フジコナカイガラムシ	30日前まで 前日まで	2 回以内 3 回以内	○カキクダアザミウマでは産卵開始期間(5月)が重要な防除時期である。 ○チャノキイロアザミウマは4月~10月迄加害が続くが、開花期の被害果は果実に星型、座布団型のアザが残るので防除を徹底する。
3 5月下旬 開花直前 月 日	3 1	水 展着剤(マイリノー) アーデントフロアブル トップジンM水和剤	100 ℓ 5 mℓ 50 mℓ 100 g	20,000 倍 2,000 倍 1,000 倍	400 ℓ	円星落葉病 うどんこ病 炭疽病 カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カメムシ類	前日まで 前日まで	3 回以内 6 回以内	○開花前の草刈りはアザミウマの樹上移動を多くするので控える。 ○5月下旬~7月上旬の期間は円星落葉病の感染時期となるので丁寧に散布する。
4 6月上旬 ~ 6月中旬 落花後 月 日	M3 4	水 展着剤(マイリノー) トレノックスフロアブル ⑩ アドマイヤー水和剤	100 ℓ 5 mℓ 200 mℓ 100 g	20,000 倍 500 倍 1,000 倍	500 ℓ	うどんこ病 円星落葉病 炭疽病 黒星病 カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カメムシ類	30日前まで 7日前まで	2 回以内 3 回以内	○クレフノン50倍(2kg)を混用すると黒点状、破線状が軽減出来る。

5 6月下旬 ～ 7月上旬 月 日	3 1	水 展着剤(マイリノー) キノンドー顆粒水和剤 スミチオン水和剤40	100 ℓ 5 mℓ 100 g 100 g	20,000 倍 1,000 倍 1,000 倍	500 ℓ	円星落葉病 炭疽病 黒星病 うどんこ病 カキノヘタムシガ カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヒメヨコバイ カメムシ類	14日前まで 30日前まで	3 回以内 3 回以内	
6 7月中旬 月 日	M1 4	水 展着剤(マイリノー) スコア顆粒水和剤 ダントツ水溶剤	100 ℓ 5 mℓ 33 g 50 g	20,000 倍 3,000 倍 2,000 倍	500 ℓ	炭疽病 コナカイガラムシ カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ カメムシ類	前日まで 7日前まで	5 回以内 3 回以内	○カキノヘタムシガの第1世代成虫の発生時期である。 ○周辺が林地の場合およびカメムシの発生が多い場合は、ダントツ水和剤に替えてアーデントフロアブル2,000倍(50mℓ・前日まで)を使用する。
7 8月上旬 ～ 8月中旬 月 日	M1 1	水 展着剤(マイリノー) キノンドー顆粒水和剤 スミチオン水和剤40	100 ℓ 5 mℓ 100 g 100 g	20,000 倍 1,000 倍 1,000 倍	500 ℓ	うどんこ病 炭疽病 カキノヘタムシガ イラガ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ	14日前まで 30日前まで	5 回以内 3 回以内	
8 8月下旬 ～ 9月上旬 月 日	3 1	水 展着剤(マイリノー) アーデントフロアブル トップジンM水和剤	100 ℓ 5 mℓ 50 mℓ 100 g	20,000 倍 2,000 倍 1,000 倍	500 ℓ	炭疽病 すす点病 チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ カメムシ類	前日まで 前日まで	3 回以内 6 回以内	○スミチオン水和剤40は、平核無の着色期以降の使用はしない。(葉害を生じることがある) ○降雨が多いと、すす点病が多くなるので、防除を徹底する。
9 9月下旬 月 日	M7 4	水 展着剤(マイリノー) ベルコート水和剤 Ⓧ アドマイヤー水和剤	100 ℓ 5 mℓ 100 g 100 g	20,000 倍 1,000 倍 1,000 倍	500 ℓ	うどんこ病 炭疽病 すす点病 チャノキイロアザミウマ カメムシ類	14日前まで 7日前まで	3 回以内 3 回以内	○降雨が多いと、すす点病が多くなるので、防除を徹底する。 ○すす点病が発生する圃では9月中旬にトップジンM水和剤1,000倍(100g・前日まで)を特別散布する。